

Topologie

8. Übungsblatt, SoSe 2017

Freiwillige Abgabe in den Übungen am 28.06.2017

(1) Es sei G eine topologische Gruppe und \mathcal{U} das Umgebungssystem des Einselements e . Zeigen Sie:

- (a) Zu jedem $U \in \mathcal{U}$ gibt es ein $V \in \mathcal{U}$ mit $V^2 \subset U$.
- (b) Zu jedem $U \in \mathcal{U}$ gibt es ein $V \in \mathcal{U}$ mit $V^{-1} \subset U$.
- (c) Zu jedem $U \in \mathcal{U}$ und $x \in U^\circ$ gibt es ein $V \in \mathcal{U}$ mit $xV \subset U$.
- (d) Zu jedem $U \in \mathcal{U}$ und $x \in G$ gibt es ein $V \in \mathcal{U}$ mit $xVx^{-1} \subset U$.

Dabei bedeuten $V^2 = \{v^2 : v \in V\}$, $V^{-1} = \{v^{-1} : v \in V\}$, $xV = \{xv : v \in V\}$, $xVx^{-1} = \{xvx^{-1} : v \in V\}$.

(2) Es sei \mathbf{A} eine nichtleere Indexmenge mit einer Ordnungsrelation \prec . Für jedes $\alpha \in \mathbf{A}$ gebe es einen topologischen Raum $(X_\alpha, \mathcal{T}_\alpha)$ und zu je zwei Indizes $\alpha, \beta \in \mathbf{A}$ mit $\alpha \prec \beta$ eine stetige Abbildung $f_{\beta\alpha} : X_\beta \rightarrow X_\alpha$, sodass gilt:

- (i) $f_{\alpha\alpha} = \text{id}_{X_\alpha}$ für alle $\alpha \in \mathbf{A}$,
- (ii) $f_{\gamma\alpha} = f_{\beta\alpha} \circ f_{\gamma\beta}$ für alle $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{A}$ mit $\alpha \prec \beta \prec \gamma$, d.h. das Diagramm

$$\begin{array}{ccc} X_\beta & \xleftarrow{f_{\gamma\beta}} & X_\gamma \\ f_{\beta\alpha} \downarrow & \swarrow f_{\gamma\alpha} & \\ X_\alpha & & \end{array}$$

ist kommutativ.

Dann heißt $(X_\alpha, f_{\alpha\beta})_{\alpha, \beta \in \mathbf{A}}$ ein *projektives System* topologischer Räume. Zeigen Sie:

(a) Es gibt einen topologischen Raum $(X, \mathcal{T}) = \varprojlim X_\alpha$ mit folgender „universeller Eigenschaft“:

- (*) Ist Y ein beliebiger topologischer Raum und gibt es stetige Abbildungen $(g_\alpha : Y \rightarrow X_\alpha)_{\alpha \in \mathbf{A}}$, sodass für jedes Paar $\alpha, \beta \in \mathbf{A}$ mit $\alpha \prec \beta$ gilt $g_\alpha = f_{\beta\alpha} \circ g_\beta$, so gibt es eine eindeutig bestimmte stetige Abbildung $g : Y \rightarrow X$, sodass $g_\alpha = f_\alpha \circ g$ für jedes $\alpha \in \mathbf{A}$.

- (b) Durch diese Eigenschaft ist X bis auf Homöomorphie bestimmt, d.h. hat ein weiterer topologischer Raum X' mit stetigen Abbildungen $(f'_\alpha)_{\alpha \in A}$ die Eigenschaft (*), so gibt es einen eindeutig bestimmten Homöomorphismus $h: X' \rightarrow X$, sodass $f'_\alpha = f_\alpha \circ h$ für alle $\alpha \in A$.

Der Raum $X = \varprojlim X_\alpha$ heißt *projektiver* oder *inverser* Limes der X_α .

- (3) Es seien $(Y_\beta)_{\beta \in B}$ topologische Räume. Das System A aller nichtleeren endlichen Teilmengen von B werde durch die Mengeninklusion geordnet. Zu $\alpha \in A$ werde $X_\alpha = \prod_{\beta \in \alpha} Y_\beta$ mit der Produkttopologie versehen. Zeigen Sie, dass sich der Produktraum $\Pi = \prod_{\beta \in B} Y_\beta$, versehen mit der Produkttopologie mit dem projektiven Limes $\varprojlim X_\alpha$ identifizieren lässt.
- (4) Ham-Sandwich-Problem: Eine Scheibe Brot sei mit einer Scheibe Schinken belegt. Aufgabe ist es, durch einen geraden Schnitt Brot und Schinken gleichzeitig zu halbieren. Ist das Problem lösbar?