

Topologie

9. Übungsblatt, SoSe 2017

Freiwillige Abgabe in den Übungen am 05.07.2017

(1) Zeigen Sie:

- (a) Jede nichtleere, offene, zusammenhängende Menge des \mathbb{R}^n ist wegzusammenhängend. Können Sie das Ergebnis verallgemeinern?
- (b) Jede Zusammenhangskomponente einer offenen Menge in \mathbb{R}^n ist offen, und es gibt höchstens abzählbar viele Komponenten. Können Sie das Ergebnis verallgemeinern?

(2) Zeigen Sie:

- (a) Ist X ein zusammenhängender topologischer Raum und \sim ein Äquivalenzrelation auf X , so ist der Quotientenraum X/\sim zusammenhängend.
- (b) Ein topologischer Raum X ist genau dann zusammenhängend, wenn jede stetige Abbildung von X in einen diskreten Raum mit mindestens zwei Punkten konstant ist.

(3) Es sei Ω der Ordinalzahlraum aus Beispiel 4.1.7. Geben Sie ein Netz in Ω_0 an, das gegen $\omega_1 \in \Omega$ konvergiert.

(4) Die Menge $X := \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$ werde mit folgender Topologie versehen:

- (i) $X \setminus \{(0, 0)\}$ trage die diskrete Topologie.
- (ii) Eine Menge $U \subset X$ ist eine Umgebung von $(0, 0)$, wenn $(0, 0) \in U$ und die Mengen $\{n \in \mathbb{N}_0 : (n, m) \notin U\}$ für fast alle $m \in \mathbb{N}_0$ endlich sind.

Zeigen Sie:

- (a) Es ist X ein Hausdorffraum.
- (b) Es gibt keine Folge in $X \setminus \{(0, 0)\}$, die gegen $(0, 0)$ konvergiert.
- (c) Es gibt eine Folge (x_n) in $X \setminus \{(0, 0)\}$, die $(0, 0)$ als Häufungswert hat, aber keine Teilfolge von (x_n) konvergiert gegen $(0, 0)$.